


Chelidonium

伟大的肝脏治疗药物



顺势

ISO 9001-2000 Certified



白屈菜

(规格含量: 1: 10)

白屈菜属于罂粟属，其母酞剂来源于整颗植物。作为治疗性植物，白屈菜已经有很长的使用历史。其辛辣的汁液可用于去除眼角膜上的薄翳，而且对血液和黄疸也有较好效果。白屈菜可用作良好的血液清洁剂。

功效: 白屈菜可辅助肝脏及胆囊功能，保护其免受肝损伤，对胃肠系统具有解痉功能，可促进胆汁流动；对真菌感染及肉赘具有局部的抗菌功效，可减少良性肿瘤的发病（局部肿瘤或体内肿瘤）。

药理作用: 利胆剂、SPOSMOLYTIC、轻泻剂、抗炎性、抗病毒性、创伤治疗（局部）及抗肿瘤。

适应症: 肝脏及胆囊紊乱，胃肠系统及胆管抽筋似的疼痛，包括过敏性肠部综合症、作为灌肠剂用于结肠息肉病，用于肉赘的局部治疗。

胆囊性疾病、胆结石、肝脏疾病、黄疸、肝炎、通过肝脏及肠部辅助人体的解毒功能；肝脾充血、偏头痛、胆汁病引起的头痛及眼眶神经痛、胃炎及胃溃疡及腹部疼痛。

主要成分: 异喹啉生物碱（0.35 1.3%），包括主要的生物碱。白屈菜碱（0.7%）。

白屈菜赤碱；血根碱；黄连素 **captisine** 及所有的刺罂粟碱；其他的生物碱及金雀花碱（通常存在于豆科植物如豌豆中），类黄酮及酚酸。

药理毒理: 从以确定的剂量中，未发现有害或有毒的症状。

禁忌: 未知。

注意事项: 基于该药草的生物碱含量，不建议长期服用（除非局部使用）。

药物相互作用: 未知

孕妇及哺乳期妇女用药: 未见有不良症状。

对驾驶及机器操作的影响: 未见有不良症状。

副作用: 若未经加工便服用，大部分病人出现头昏眼花、胃部不适、腹泻、腹部膨胀、恶心及轻微的白血球减少症。若停止使用，3-5天后，症状便可消失。

过量服用: 未知。

用法用量: 滴剂，滴入 20-30 滴在半杯水中服用，每日三次。片剂，每次一片，每日三次。

包装: 滴剂，20ml。片剂，20片。